

患者關於新冠肺炎治療的常見問題



請將方框
換成
使用組織的
徽標

我應該要求醫生開藥來治療我的新冠肺炎感染嗎？

即使你接種了疫苗，如果以下任何一項適用於你，你可能比其他人更容易因新冠肺炎罹患重病，並需要住院治療：

- 你已50歲或50歲以上
- 你有一個或多個特定的健康問題（見下文）
- 你有免疫系統低下或減弱

事關重要，你需要立即找醫生諮詢。

新冠肺炎治療可以幫助防止病情惡化，但必須在症狀開始後的幾天內開始。

所以，不要等待。

哪些健康問題會增加我因新冠肺炎患重病或需要住院治療的風險？

部分健康問題包括：

- 慢性心臟病、肺病或腎病
- 糖尿病
- 癌症
- 體重過重
- 艾滋病毒感染
- 藥物成癮
- 嚴重哮喘

有關健康問題的完整列表，請訪問 cdc.gov/covidtreatment

每位50歲或50歲以上的人，即使你沒有潛在的健康問題，如果出現新冠肺炎症狀，也應該找醫生諮詢。年齡大是新冠肺炎併發症的最大風險因素。

如果我的症狀很輕呢？我還需要接受新冠肺炎治療嗎？

如果你因年齡或潛在的健康問題而罹患新冠肺炎重病的風險增加，那麼，一旦出現新冠肺炎症狀，就立即找醫生諮詢，此事事關重要。

無論你的症狀有多輕微，你都可能需要治療。要想效果良好，治療必須在症狀出現後幾天內開始。

因此，立即找醫生諮詢。

都有什麼治療方法？

為了防止你的新冠肺炎病情惡化，醫生可以給你開抗病毒藥物。

抗病毒藥物可以阻止新冠病毒在體內復制及擴散

抗病毒藥物可以是口服片劑，也可以是靜脈注射或滴注，即是用針頭將藥物緩慢輸送到靜脈中。

你的醫生會決定治療是否適合你，以及哪種治療最適合你。

想要了解更多關於授權或批准的新冠肺炎治療方法，請訪問 cdc.gov/covidtreatment

新冠肺炎治療會給我帶來副作用嗎？

部分患者——但並非所有患者——經歷過新冠肺炎治療的副作用。最常見的副作用包括：

- 噁心
- 腹瀉
- 味覺改變
- 肌肉或腹部不適或疼痛
- 血壓比平時高
- 感覺渾身不適

嚴重的過敏反應可能發生，但極為少見。過敏反應的症狀包括：

- 蕁麻疹
- 吞嚥或呼吸困難
- 口腔、嘴唇或面部腫脹
- 皮疹
- 喉嚨發緊或聲音嘶啞

如果你出現以上任何反應，請停止服藥，並立即致電給你開處方藥的醫生或撥打911。

如果我是孕婦或正在哺乳，我應該接受新冠肺炎治療嗎？

研究人員仍在研究合宜的新冠肺炎治療對孕婦或哺乳期患者的安全性。向醫生諮詢新冠肺炎治療是否對你適合。

如果得不到治療新冠肺炎的處方藥，我該如何自我護理？

你的醫生會根據你的風險和其他健康問題向你解釋如何在家自我護理。

一般來說，新冠肺炎患者可以通過以下方式緩解一些症狀，如發燒和疼痛：

- 服用非處方藥
- 大量飲水
- 休息

在症狀出現後至少10天，居家隔離保護他人非常重要，待在一間房間裡（如果可能的話）並在接近家人時戴上合適的口罩以保護家人。

如罹患新冠肺炎向醫生諮詢有關自我護理和保護他人的更詳細建議。

